

► Cabinet dentaire des Docteurs LEMAIRE et JORDAN

Chirurgiens-Dentistes

📍 91 avenue Domenget 73190 CHALLES LES EAUX

☎ Tel. : +33 4 79 85 40 26

🌐 dr-olivier-lemaire.chirurgiens-dentistes.fr

Le tabac et votre santé bucco-dentaire

Si les fumeurs savent que leur santé est menacée par le tabac, peu connaissent les dégâts qui se développent à bas bruit dans leur bouche.

Ce sont souvent les colorations dues aux dépôts de nicotine sur les dents, et aussi sur les prothèses et obturations esthétiques, qui poussent le patient fumeur à consulter. Les dégâts jusque-là invisibles peuvent s'avérer importants.

LES GINGIVITES

Pour le fumeur, apparemment tout va bien : pas de gencive enflée ni de saignement au brossage. Or, fumer masque un certain nombre de symptômes et, chez le fumeur, les réactions naturelles à la gingivite sont ainsi camouflées.

- > La nicotine stimule la libération d'adrénaline ce qui entraîne une diminution du calibre des vaisseaux.
- > Le monoxyde de carbone est responsable d'une baisse du transport d'oxygène dans les tissus.

Finalement, la mauvaise irrigation des gencives par un sang appauvri en oxygène entraîne une diminution des signes inflammatoires et des saignements, retardant ainsi le diagnostic de la pathologie et la mise en place d'un traitement.



LES INTERVENTIONS CHIRURGICALES

Dans le cas d'une intervention chirurgicale (extraction dentaire, pose d'implant...) il est recommandé de ne plus fumer car la diminution de la vascularisation de la gencive, et de l'os de support, entraîne une moins bonne cicatrisation. Le risque de suites post-opératoires douloureuses est augmenté à cause de la difficulté pour le caillot sanguin à se former ; l'hémostase est ralentie et les muqueuses cyanosées.



LE BLANCHIMENT DENTAIRE


Il est bon de savoir que le tabac n'est pas responsable de la formation de tartre mais de sa coloration, et qu'une séance de détartrage permet d'éliminer ces taches. Cependant, si l'on envisage un traitement de blanchiment des dents, il faut envisager d'arrêter de fumer, au moins pendant la durée du traitement et si possible après !

À SAVOIR


Une chirurgie buccale peut ainsi être une excellente occasion pour prendre la décision de ne plus fumer, avec un réel bienfait tant pour votre santé bucco-dentaire que pour votre santé en général.



Χαλαρή αίσθηση στο στόμα, που μπορεί να οφείλεται στην χρήση ορισμένων φαρμάκων ή στην αλλαγή της διατροφής. Συνήθως είναι προσωρινή και εξαφανίζεται μόνη της.




Πόνος στο στομάχι ή διάρροια, που μπορεί να οφείλεται στην αλλαγή της διατροφής ή στην χρήση ορισμένων φαρμάκων. Συνήθως είναι προσωρινή και εξαφανίζεται μόνη της.




Πονοκέφαλος ή ζάλη, που μπορεί να οφείλεται στην αλλαγή της διατροφής ή στην χρήση ορισμένων φαρμάκων. Συνήθως είναι προσωρινή και εξαφανίζεται μόνη της.

“ Χρησιμοποιήστε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακείου. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας. ”



XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

- > Χρησιμοποιήστε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακείου. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας.
- > Χρησιμοποιήστε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακείου. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας.
- > Χρησιμοποιήστε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακείου. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας.



XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX

- > Χρησιμοποιήστε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακείου. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας.
- > Χρησιμοποιήστε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακείου. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας.
- > Χρησιμοποιήστε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακείου. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας.

À SAVOIR

Χρησιμοποιήστε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακείου. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας.

Χρησιμοποιήστε το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακείου. Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό σας.



